



De: Gerência de Vigilância Epidemiológica de Várzea Grande - Alessandra Carreira	Para: Responsável técnica pela Vigilância em Saúde - Relva Cristina	Data: 24/06/2020	Nº. CI 128/2020 SVS/SMS-VG
--	---	------------------	----------------------------

Cumprimento V.S.^a cordialmente e,

Vimos por meio deste, responder aos questionamentos do item 38 a respeito do certame.

A diferenciação do IgG e IgM faz-se necessária para identificar a fase inicial ou fase aguda da doença. No que tange ao SARS-CoV-2, a detecção combinada de IgM + IgG é mais apropriada do que a detecção separada destas duas imunoglobulinas, pois a detecção combinada de IgM + IgG aumenta a sensibilidade global sem prejudicar a interpretação clínica.

Então, pode-se afirmar que essa combinação possibilita um perfil completo, que revela múltiplas possibilidades de resultados, como:

Se o paciente já teve contato, não está mais com a doença, mas produziu anticorpos;

Se o paciente já teve contato, ainda está com a doença, mas o corpo já produziu anticorpos;

Se o paciente teve contato, está com a doença, e ainda não possui anticorpos;

Se ele nunca teve contato e, por isso, não possui anticorpos.

Necessita-se do Laudo do INCQS para controle de qualidade do teste para diagnóstico preciso.

Em relação as lancetas, a mesma não necessita ser disponibilizada com os testes, pode ser adquirida separadamente.

O prazo oportuno para entrega do insumo solicitado seria 10 dias úteis, visto que estamos vivendo uma emergência em Saúde Pública e necessitamos de agilidade no processo.

Pode-se sim, considerar o prazo de entrega de amostra de até 05 dias úteis.

Alessandra Carreira R. Gajardoni
Gerente de Vigilância
Epidemiológica SMS/VG

Alessandra Carreira
Gerente de Vigilância Epidemiológica